



Ospedale  
di Circolo

Fondazione  
Macchi

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi  
AZIENDA OSPEDALIERA – POLO UNIVERSITARIO



Dipartimento Materno Infantile – Direttore: Dott. Massimo Agosti

SSD ORL – Servizio di Audiologia

Responsabile: Dott. Eliana Cristofari

Agli Utenti dell'Audiologia  
Portatori di Impianto cocleare

**Oggetto:** aggiornamento vaccinazioni

Gentile utente,

come ricorderà, in quanto candidato all'impianto cocleare, si è sottoposto alle vaccinazioni per la profilassi della meningite batterica disponibili all'epoca dell'impianto.

La Regione Lombardia con Deliberazione N° X / 3993 Seduta del 04/08/2015 ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).) dispone quanto le riassume di seguito:

“Il presente documento intende aggiornare la precedente DGR 4475/2012 in merito all'offerta vaccinale alle categorie/condizioni a rischio, stante le nuove evidenze provenienti dalla letteratura e la disponibilità di nuovi vaccini. Rimane invariata l'indicazione ad offrire, a seconda della patologia trasmissibile del caso, in modo attivo e gratuito la profilassi vaccinale a contatti e conviventi suscettibili secondo gli indirizzi nazionali e regionali.

*In particolare per i portatori di impianto cocleare*

### **Vaccinazione anti Haemophilus tipo b**

Una singola dose di vaccino è consigliata ai soggetti di qualsiasi età, che non abbiano ricevuto il ciclo di base, affetti da: “omissis..” portatori di impianto cocleare.

### **Vaccinazione anti-pneumococco.**

In modo prioritario sarà offerta una schedula sequenziale PCV13+PPV23 in alcune condizioni definite come ad alto rischio per malattia invasiva batterica: “omissis” portatori di impianto cocleare. In tutte le categorie a rischio di seguito elencate andrà valutata la possibilità di somministrare una prima dose con vaccino coniugato 13-valente seguita da una dose di vaccino polisaccaridico 23-valente: - Cardiopatie croniche - Malattie polmonari croniche

Sistema Sanitario  Regione  
Lombardia

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Polo universitario

di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.111 fax 0332 261.440

[www.ospedativarese.net](http://www.ospedativarese.net) P.IVA e C.F.: 00413270125

Presidio di Varese Ospedale di Circolo Fondazione Macchi viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332 278.203 fax 0332 278.591

e-mail: [eliana.cristofari@ospedale.varese.it](mailto:eliana.cristofari@ospedale.varese.it)

- Diabete Mellito - Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool - Alcoolismo cronico - Sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica.

*La ASL di Varese con documento Revisione 01 del 19.05.2014 propone uno schema che dovrebbe aver già ricevuto ma che le alleghiamo ulteriormente.*

### **Vaccinazione anti-meningococco**

In modo prioritario saranno offerte la vaccinazione monovalente antimeningococco B e quella quadrivalente antimeningococco ACW135Y in alcune condizioni definite come ad alto rischio per malattia invasiva batterica, di seguito elencate: "omissis"

In tutte le categorie a rischio di seguito elencate andrà valutata la possibilità di somministrare la vaccinazione monovalente antimeningococco B e quella quadrivalente antimeningococco ACW135Y: - "omissis" portatori di impianto cocleare.

Ho ritenuto doveroso informarvi e sollecitarvi ad adeguare il vostro piano vaccinale in merito a queste recenti indicazioni rivolgendovi al vostro medico curante/pediatri di libera scelta o al distretto sanitario della vostra ASL portando il libretto delle vaccinazioni così da poter facilitare il controllo di quanto già eseguito.

Sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti a nome di tutto il gruppo di Audiovestibologia .

Varese, 6 ottobre 2015

Il Responsabile  
Elia CRISTOFARI

  
Ospedale di Circolo e F.lli. Macchi Varese  
SSD ONL - SERVIZIO DI AUDIOVESTIBOLOGIA  
IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE  
Dot.ssa ELIANA CRISTOFARI  
Cod. Fisc. CRS LNE 65R67 C680Q

**RACCOMANDAZIONI PER LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA  
IN PAZIENTI CANDIDATI ALL'IMPIANTO O GIA' PORTATORI DI IMPIANTO COCLEARE**

I vaccini disponibili per l'immunizzazione attiva contro le malattie sostenute dai sierotipi di *Streptococcus Pneumoniae* contenuti nei vaccini sono:

- Vaccino Coniugato Pneumo 13 (PCV 13), contro 13 sierotipi, somministrabile dal 3° mese di vita;
- Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23), contro 23 sierotipi, somministrabile dall'età di 2 anni.

Per tale patologia le Raccomandazioni nazionali e internazionali prevedono la somministrazione di entrambi i vaccini, con le seguenti modalità:

**1. Paziente mai vaccinato:**

- a. Somministrare prima il Vaccino Coniugato Pneumo 13 (PCV 13). Il numero di dosi da somministrare dipende dall'età del soggetto, secondo la schedula vaccinale in uso. Dall'età di 2 anni è sufficiente un'unica dose.
- b. Dopo almeno 8 settimane dall'ultima dose di Pneumo 13 somministrare una dose di Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23).
- c. Dopo 5 anni dalla prima dose di Pneumo 23, somministrare un'unica rivaccinazione con Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23).

**2. Paziente già vaccinato con 1 dose di Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23):**

- a. Dopo almeno un anno somministrare una dose di vaccino Coniugato Pneumo 13 (PCV 13).
- b. Unica rivaccinazione con Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23) dopo almeno un anno dal vaccino Coniugato Pneumo 13 (PCV 13) e almeno 5 anni dalla prima dose di Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23):

**3. Paziente già vaccinato con 2 dosi di Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23):**

- a. Dopo almeno un anno dall'ultima dose di Pneumo 23, somministrare una dose di vaccino Coniugato Pneumo 13 (PCV 13).

**4. Paziente già vaccinato con Vaccino Coniugato Pneumo 13 (PCV 13) e di età  $\geq 2$  anni:**

- a. Dopo almeno 8 settimane dall'ultima dose di Pneumo 13 somministrare una dose di Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23)
- b. Dopo 5 anni dalla prima dose di Pneumo 23, somministrare un'unica rivaccinazione con Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23).

**NB:** Quando la prima dose di Vaccino Polisaccaridico Pneumo 23 (PPSV23) è somministrato all'età  $\geq 65$  anni, non è prevista la rivaccinazione.